



Bollettino fitosanitario cerasicolo d'Alpone n. 5 del 15/04/2020

con il contributo
delle
amministrazioni
Comunali della
val d' Alpone



Andamento meteo

In questa settimana appena trascorsa abbiamo avuto temperature medie giornaliere che, mediamente, sono state di circa 1½°C. sopra le serie storiche del periodo e, probabilmente, rimarranno tali anche per i prossimi 3/4 giorni, con una pioggia che in questa prima quindicina d'Aprile manca e, questo, potrà portare tra non molto a uno stato di sofferenza, pertanto, chi ha la possibilità, è bene che ricorra a irrigazioni di soccorso.

Fase fenologica: in questo momento siamo nella fase di caduta petali, per le varietà tardive, allegagione e scamicatura per le altre, mentre per le precocissime si è all'inizio dell'ingrossamento del frutto.

Difesa fitosanitaria

Parassiti Fungini

Monilia (*Monilia laxa* e *Monilia fructigena*): l'attuale situazione di assenza di piogge e le forti folate di vento di questi giorni, particolarmente quella del pomeriggio di Martedì 14, le condizioni di umidità sono relativamente basse pertanto non c'è alcuna necessità di interventi fungicidi contro questa crittogama.

Parassiti animali

Afide nero del Ciliegio (*Myzus cerasi*), è un parassita problematico che può compromettere colonizza le foglie ed i germogli e provoca danni ai peduncoli dei frutti o alle ciliegie.

Lepidotteri defoglia tori

Falena brumale (*Operophthera brumata*): è una farfalla che provoca allo stato larvale delle erosioni sui lembi delle foglie, che sembrano bucherellate e sui frutticini provocano un danno simile a quello dei ricamatori, le gemme sono, a volte, irrimediabilmente danneggiate all'interno.



Varietà begareaux
(Montecchia di Crosara)
Foto di Leorato Pierluigi



Capua (*Adoxophyes orana*): è un altro ricamatore.

Cacecia dei fruttiferi (*Archips* spp.): le larve attaccano i germogli, su cui provocano erosioni, i mazzetti fiorali, che distruggono entrando direttamente nei fiori, ed il frutticino.


Geometridi: famiglia di lepidotteri le cui larve rodono le giovani foglie e in qualche caso anche i frutticini

Azioni di contrasto

Se non già eseguito in prefioritura, attuare un trattamento insetticida non prima della completa caduta dei petali fiorali, preferibilmente con prodotti a base di Acetamiprid (max 2 interventi all'anno), oppure con Pirimicarb, o Spirotetramat (anche per questi massimo 1 interventi anno), o Tauflualinate (massimo 2 interventi all'anno).

DIVULGAZIONE

Considerato il momento della celere necessità comunicativa l'Associazione Cerasicoltori del Comune di Montecchia di Crosara si avvale del supporto di AIPO Associazione Interregionale Produttori Olivicoli per la divulgazione del bollettino fitosanitario. In merito, AIPO ha reso disponibile **[l'APP AIPOVERONA scaricabile dal vostro appstore gratuitamente](#)** dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura. Si fa presente che AIPO è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.



Si inserirà inoltre il bollettino fitosanitario sui siti:

<http://www.aipoverona.it/bollettino-ciliegiciliegio--val-dalpone>

<http://www.ciliegivaldalpone.it/> DISPONIBILE DALLA PROSSIMA SETTIMANA