

PROGETTO:



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA **VERONA**

BANCO BPM



**COLDIRETTI
VERONA**

BOLLETTINO CIMICE ASIATICA 2021

ANNO 2021 NUMERO 09

03 GIUGNO 2021





AREA NORD - PESCO/KIWI


CATTURE PERIODO DAL 27/05/2021 AL 03/06/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	03/06/21	Kiwi	fioritura	2	0
Valeggio	Campazzo	03/06/21	Pesco	frutti 3-4 cm diametro	2	0
Valeggio	SP24	03/06/21	Pesco	accrescimento frutti	2	0
Valeggio	Santa Lucia	03/06/21	Pesco	frutti 4-5 cm diametro	10	0
Valeggio	Borghetto	03/06/21	Kiwi	inizio fioritura	2	0
Villafranca	Quaderni	03/06/21	Pesco	frutti 4-5 cm diametro	0	0
Villafranca	Villafranca	03/06/21	Kiwi	fioritura	0	0
Sommacampagna	Gasparina	03/06/21	Kiwi	frutti 5-6 cm diametro	0	0
Sommacampagna	Sommacampagna	03/06/21	Pesco	frutti 4-5 cm diametro	0	0
Sona	Sona	03/06/21	Pesco	frutti 3-4 cm diametro	0	0
Villafranca	Belladonna	03/06/21	Pesco	accrescimento frutti	1	0
Sommacampagna	Cesarina	03/06/21	Pesco	accrescimento frutti	0	0
Bussolengo	Madonnina	03/06/21	Pesco	accrescimento frutti	1	0
Pescantina	Pescantina	03/06/21	Pesco	accrescimento frutti	0	0
Villafranca	Aeroporto	03/06/21	Pesco	frutti 3-4 cm diametro	0	0
Villafranca	Ceolara	03/06/21	Pesco	accrescimento frutti	0	0
Sona	Festara	03/06/21	Pesco	frutti 4-5 cm diametro	0	0
Pescantina	Settimo	03/06/21	Pesco	accrescimento frutti	1	0
Villafranca	Alpo	03/06/21	Pesco	frutti 4-5 cm diametro	0	0
Verona	Basson	03/06/21	Kiwi	inizio fioritura	1	0
Pastrengo	Pastrengo	03/06/21	Olivo	fioritura	1	0



AREA NORD - PESCO/KIWI

Livello catture 9° rilievo 03/06/21



Commenti al bollettino n. 9 del 03 giugno 2021

Nell'area NORD-OVEST pesco-kiwi aumentano leggermente le catture di adulti. La percentuale di trappole positive è del 50% e la media è di 1 per trappola. Per ora non si segnalano presenze di stadi giovanili nelle trappole, anche se da più parti sono segnalate nascite, per cui si stima che lo stadio giovanile al momento sia quello di neanide neonata. Con questi numeri, eventuali interventi contro gli adulti svernanti vanno valutati attentamente con il proprio tecnico di fiducia. Lo stadio giovanile eventualmente presente in questa fase non viene normalmente attratto dai feromoni delle trappole per la tendenza di questo primo stadio a rimanere presso l'ovatura e per la ancora bassa mobilità. Per ora non è consigliato quindi intervenire contro gli stadi giovanili, essendo ancora in fase iniziale di sviluppo. Invece può essere consigliato intervenire con prodotti non fitosanitari (corroboranti, concimi folgiari, ecc.) che, nelle varie sperimentazioni attuate da enti di ricerca, possono aver dimostrato un qualche effetto sui batteri endosimbionti delle ovature, meccanismo di azione che è ancora allo studio. Si ribadisce l'importanza di utilizzare elevati volumi di acqua per favorire una bagnatura ottimale e di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.



AREA SUD - MELO/PERO

CATTURE PERIODO DAL 27/05/2021 AL 03/06/2021


Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	01/06/21	Melo	frutticino 4cm	7	0
LEGNAGO	Bardolino	01/06/21	Melo	frutticini 4,5cm	50	0
LEGNAGO	Cavallino	01/06/21	Pero	frutticini 3,5cm	38	0
BOSCHI SANT'ANNA	Caseggiato	01/06/21	Pero	frutticini 4,5cm	13	0
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	01/06/21	Pero	frutticini 4cm	27	0
TERRAZZO	Nichesola	01/06/21	Pero	frutticini 3,5cm	16	0
TERRAZZO	Bosco	01/06/21	Pero	frutticini 3cm	4	0
TERRAZZO	Graizzara	01/06/21	Pero	frutticini 3,5cm	12	0
BEVILACQUA	Marega	01/06/21	Melo	frutticini 3,5cm	28	0
BEVILACQUA	Bevilacqua	01/06/21	Melo	frutticini 4cm	11	0
VILLA BARTOLOMEA	Villabartolomea	01/06/21	Pero	frutticini 3cm	20	0
VILLA BARTOLOMEA	Villabartolomea	01/06/21	Melo	frutticini 4cm	14	0
CASTAGNARO	Valli	01/06/21	Pero	frutticini 4cm	54	0
CASTAGNARO	Emissario	01/06/21	Pero	frutticini 3,5cm	14	0
ANGIARI	Angiari	01/06/21	Melo	frutticini 4cm	12	0
MINERBE	Minerbe	01/06/21	Melo	frutticini 4,5cm	14	0
BADIA POLESINE	Badia Polesine	01/06/21	Pero	frutticini 3,5cm	20	0
LENDINARA	Lendinara	01/06/21	Pero	frutticini 3,5cm	28	0
TRECENTA	Trecenta	01/06/21	Pero	frutticini 3,5cm	4	0




AREA SUD - MELO/PERO

CATTURE PERIODO DAL 27/05/2021 AL 03/06/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	01/06/21	Pero	frutticini 4,5cm	7	0
BONAVIGO	Padovana	01/06/21	Pero	frutticini 4cm	6	0
BONAVIGO	San Pietro	01/06/21	Pero	frutticini 3,5cm	4	0
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	01/06/21	Pero	frutticini 3cm	11	0
OPPEANO	Oppeano	01/06/21	Melo	frutticini 3,5cm	12	0
PALU'	Casotti	01/06/21	Melo	frutticini 3,5cm	6	0
PALU'	Acquabona	01/06/21	Pero	frutticini 3,5cm	12	0
RONCO ALL'ADIGE	Boccarà	01/06/21	Pero	frutticini 3,5cm	12	0
RONCO ALL'ADIGE	Tomba	01/06/21	Melo	frutticini 4,5cm	5	0
ALBAREDO D'ADIGE	Albaredo	01/06/21	Melo	frutticini 4,5cm	11	0
BELFIORE	Provinciale 39	01/06/21	Melo	frutticini 4cm	10	0
BELFIORE	????	01/06/21	Melo	frutticini 3cm	35	0
BELFIORE	Riva adige	01/06/21	Melo	frutticini 4,5cm	3	0
ZEVIO	Ca' Bianca	01/06/21	Melo	frutticini 4,5cm	0	0
ZEVIO	Ca dell'Ora	01/06/21	Melo	frutticini 3,5cm	15	0
ZEVIO	Bridi	01/06/21	Pero	frutticini 3,5cm	2	0
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	01/06/21	Pero	frutticini 3,5cm	12	0
CALDIERO	Caldiero	01/06/21	Melo	frutticini 4cm	14	0
VERONA SUD	Sasse	01/06/21	Melo	frutticini 3cm	6	0
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	01/06/21	Kiwi	piena fioritura	2	0



AREA SUD - MELO/PERO



Commenti al bollettino n. 9 del 03 giugno 2021

C'è un ulteriore aumento nell'area SUD veronese delle catture di cimice asiatica, presente nel 97% dei siti monitorati. La media generale è di 15 adulti per trappola. Questa volta la media è ben distribuita tra pero e melo (16 contro 14 adulti per trappola) segno di un aumento notevole delle popolazioni nei siti coltivati a melo. A NORD vi sono in media circa 10 catture per trappola, a SUD circa 20. Per ora non si segnalano presenze di stadi giovanili nelle trappole, anche se da più parti sono segnalate nascite, per cui si stima che lo stadio giovanile al momento sia quello di neanide neonata. Tale stadio non viene normalmente attratto dai feromoni delle trappole per la tendenza di questo primo stadio a rimanere presso l'ovatura e per la ancora poca mobilità. Per ora non è consigliato quindi intervenire contro gli stadi giovanili, essendo ancora in fase iniziale di sviluppo. Gli interventi fatti sono quindi direzionati ancora verso gli adulti. Invece può essere consigliato intervenire con prodotti non fitosanitari (corroboranti, concimi folgiari, ecc.) che, nelle varie sperimentazioni attuate da enti di ricerca, possono aver dimostrato un qualche effetto sui batteri endosimbionti delle ovature, meccanismo di azione che è ancora allo studio. Si ribadisce l'importanza di utilizzare elevati volumi di acqua per favorire una bagnatura ottimale e di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.

PROGETTO :



**COLDIRETTI
VERONA**



IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI



ALBAREDO D'ADIGE



ANGIARI



BADIA POLESINE



BELFIORE



BEVILACQUA



BONAVIGO



BOSCHI
SANT'ANNA



CALDIERO



CASTAGNARO



ISOLA RIZZA



LEGNAGO



LENDINARA



MINERBE



OPPEANO



PALU'



PASTRENGO



PESCANTINA



RONCO ALL'ADIGE



ROVERCHIARA



SAN BONIFACIO



SOMMACAMPAGNA



SONA



TERRAZZO



TRECENTA



VALEGGIO SUL
MINCIO



VERONA



VILLA BARTOLOMEA



VILLAFRANCA



ZEVIO

Siamo presenti sui principali social!

<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/coldirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube



SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA