

Valpolicella Benaco Banca

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

**COLDIRETTI
VERONA****CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI**

Fase fenologica: in tutti i comprensori è iniziata la raccolta delle varietà precoci. Sulle varietà in via di maturazione le piogge degli ultimi giorni, mediamente dai 45 ai 72 mm, hanno portato a rilevati fenomeni di cracking.

Monilia (*Monilia laxa* e *Monilia fruttigena*): le importanti precipitazioni hanno portato a dilavamenti dei prodotti così, in alcuni casi, sono state riscontrate presenza talvolta virulente, anche con infezioni sulle varietà in maturazione. Va mantenuta la "copertura" con prodotti a base di *Bacillus subtilis* o *Amyloliquefaciens*, che hanno pure funzioni antibatteriche, o Fenexamid, o Boscalid, o Cyprodinil + Fludioxonil, o prodotti equiparabili.

Corineo (*Coryneum beijerinckii*): condizioni predisponenti le infezioni in presenza di sintomi intervenire con prodotti a base di Captano, o Ziram e, nei casi di elevata infezione, integrare la lotta chimica con la potatura verde allo scopo di eliminare gli organi colpiti e favorire la penetrazione della luce e la circolazione.

**Siamo presenti sui principali social!**

<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA




youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl
 Viale del Lavoro, 52
 37135 Verona VR Italia
 Tel.: +39 0458678260



Collegio dei **PERITI AGRARI**
 e **PERITI AGRARI LAUREATI**
 della **Provincia di VERONA**



Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.



Valpolicella Benaco Banca

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

COLDIRETTI VERONA

CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI

Cilindrosporiosi: le condizioni vegetative sono predisponenti le infezioni, si sono osservate ancora limitate infezioni su foglia. In ciliegeti seriamente colpiti negli scorsi anni eseguire un trattamento Fenbuconazolo.

Afidi: limitate presenze di colonie, che sono in fase di predazione e/o parassitizzazione. Non si rivela la necessità di intervento.

Ricamatori: rilevati i primi adulti di Capua (*Adoxophyes orana*) su trappola, al momento non sono necessari interventi fitosanitari.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA




youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



Collegio dei **PERITI AGRARI**
e **PERITI AGRARI LAUREATI**
della **Provincia di VERONA**



Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.



**COLDIRETTI
VERONA**

CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI

Drosophila suzukii: le catture si mantengono basse, ma la totalità delle femmine sono fertili con uova pronte alla deposizione. Date le *basse densità di popolazione, non sono state rilevati frutti colpiti, ma è necessario porre la massima attenzione in quanto siamo in una fase sensibile all'attacco.*

Bassa collina: catturate in media 1,8 femmine per trappola, di cui il 100% con gonadi sviluppate

Media collina: catturate in media 2,4 femmine per trappola, di cui il 100% con gonadi sviluppate

Alta collina: catturate in media 2,8 femmine per trappola, di cui il 100% con gonadi sviluppate

Nella bassa e media collina siamo in piena fase di suscettibilità agli attacchi di *D. suzukii*.

Da questo momento è consigliato iniziare le strategie di controllo al fine di evitare/ridurre le ovideposizioni.

Attuare un intervento con Acetamiprid (Massimo 2 interventi anno)

Si raccomanda di mantenere la copertura fino alla fase di raccolta rispettando i tempi di carenza

Per chi intendesse applicare le reti antinsetto si ricorda di chiuderle prima della fase di invaiatura, di applicare.

(Rilievi attuati da Università degli Studi di Verona – prof. Nicola Mori)



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA




youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



Collegio dei **PERITI AGRARI**
e **PERITI AGRARI LAUREATI**
della **Provincia di VERONA**



Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.