

Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 31

Data, 20 agosto 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Fase fenologica: secondo accrescimento, con olive che hanno raggiunto le dimensioni finali di sviluppo.



FRANTOIO



MORAIOLO



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada**
(ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini**
(Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.





Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2021, Numero 31

Data, 20 agosto 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Considerazioni dei tecnici Dr. Orazio Strada - Dr. Ivan Forcellini - Dr. Turchi Pierluca - Dr. Paolo Andraghetti

Rimonda estiva

Un lavoro da eseguire in questo momento sarebbe d'integrare la potatura d'inizio primavera con un'operazione di taglio per eliminare succhioni e polloni, chiamata potatura verde o rimonda, può servire pure a eliminare qualche ramo danneggiato o spezzato da eventi atmosferici o colpito da qualche malattia. In questo modo si attuerà



un risparmio d'energia per la pianta, eventualmente, se l'olivo sembra non avere una buona vigoria, vanno lasciati i succhioni più orizzontali e deboli che contribuiranno alla sintesi clorofilliana.

In questo periodo la capacità di ributto dei succhioni è cessata perciò non se ne troveranno più nell'anno successivo.

Nei oliveti ancora in formazione la potatura verde serve per costruire le branche principali, avendo la possibilità di selezionare meglio i germogli; è pure l'occasione per controllare la stabilità dei tutori, la tenuta dei legacci e togliere l'erba attorno alla pianta.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada**
(ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini**
(Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 31

Data, 20 agosto 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*): il monitoraggio settimanale sul volo degli adulti ha registrato scarse catture e infestazioni.

Chi utilizza le trappole è necessario che verifichi la funzionalità degli attrattivi ormonali e nutritivi, affinché conservino la loro capacità di richiamo.

Se si sono usate bentoniti, caolini, zeoliti verificare lo stato di copertura della vegetazione.



Foto Turchi Pierluca

Margaronia dell'olivo (*Palpita unionalis*): presenza di alcuni danni agli apici vegetativi con larve di quarta muta, in alcuni casi si sono notate erosioni anche su foglie e olive. Oramai da alcune stagioni questo lepidottero che, sino a qualche anno fa, era considerato di secondaria importanza è sempre più presente nei nostri oliveti.

L'adulto è una farfalla di colore biancastro, compare ad inizio Primavera e rimane nascosta nel fogliame per tutto il giorno, esce per alimentarsi verso sera.

Dopo l'accoppiamento la farfalla femmina produce una notevole quantità di uova, che incolla in maniera isolata o a gruppetti sovrapposti, su tutte e due le pagine fogliari in prossimità della nervatura mediana.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.





Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 31

Data, 20 agosto 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Dalle uova, dopo 4- 8 giorni, in relazione all'andamento delle temperature, nascono le larve, che vivono inizialmente in gruppo o isolate e creano, sulla pagina inferiore delle foglie, un ricovero ricoperto di fili sericei, dove, all'interno, rodono i tessuti fogliari.

Le larve sono inizialmente gialle e hanno quattro mute, nella loro trasformazione assumono un colore verde.

Sino a qualche anno fa la Margaronia causava limitati danni "divorando" i nuovi germogli, particolarmente su piante giovani, ora attacca anche le olive, che diventano "cibo" per gli stadi larvali terminali che erodono la polpa sino al nocciolo.

Una caratteristica di questo lepidottero è che non rimane fermo, nel compiere i diversi stadi, ma si sposta all'interno della pianta.

Al momento non va eseguita alcuna difesa fitosanitaria, eventualmente, se sarà necessario intervenire per la Mosca dell'olivo, tale trattamento sarà utile anche per la Margaronia.



Foto Turchi Pierluca



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 31

Data, 20 agosto 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Oziorrinco dell'olivo (*Otiorrhynchus cribricollis*): segnalato qualche attacco con erosioni a forma di mezza luna interessano in genere la foglia. Utilizzare fasce di larghezza di circa 20 cm. di lana di vetro, legandola intorno ai tronchi con dei legacci in plastica, in modo da ostacolare la risalita degli adulti dal terreno alla chioma e impedirne il passaggio dalla base del tronco alla vegetazione; ostacolare la risalita degli adulti dal terreno alla chioma.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada**
(ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini**
(Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.





Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 31

Data, 20 agosto 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Cimice asiatica (*Halymorpha halys*): limitate presenze di forme giovanili e d'adulti, che sono in continua ovideposizione. L'eventuale difesa contro la Mosca sarà utile anche a contrastare la presenza di Cimice.



Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*) e **Cercospora** (*Mycocentrospora cladosporioides*): le attuali condizioni meteo limitano le infezioni. Non attuare alcun intervento fitosanitario



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 31

Data, 20 agosto 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Lebbra dell'olivo o Antracnosi (*Colletotrichum gloeosporioides*) : si segnali la presenza di questo fungo patogeno, anche se limitato, e, questo da la misura dell'importanza del tecnico, medico delle piante, presente sul territorio per monitorare e tenere sotto controllo lo stato fitosanitario delle coltivazioni.



Eventi grandinigeni

In caso di grandine si consiglia di eseguire entro le quarantottore successive all'evento interventi di preventivi con prodotti rameici o con Dodina, massimo due trattamenti anno, alle dosi indicate in etichetta.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aiроверona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.





Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 31

Data, 20 agosto 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA



Permane una situazione molto critica in oliveti non irrigati, la situazione si presenta migliore in oliveti dove vengono fatte applicazioni di polveri di roccia e imbrattanti (caolini, bentoniti, basalti, zeoliti)



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada**
(ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini**
(Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.

