

Data, 02 aprile 2021

Volume 1, Numero 4

**CONSORZIO ORTOFRUTTA
VENETA**

Notiziario del melo e pero 2021

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

Melo


Fasi fenologiche: Gruppo Gala da "Mazzetti affioranti" a "Bottoni Rosa"; Gruppo Golden Delicious "Bottoni Rosa", presenza di qualche fiore; Granny Smith a "Bottoni rosa" inizio fiori aperti; Pink Lady "Bottoni Rosa" presenza qualche fiore - Red Delicious "Bottoni rosa" - Fuji "Bottoni rosa" inizio presenza fiori.

Se perdurano queste condizioni climatiche tra lunedì 8 e mercoledì 10 il 50% dei fiori saranno aperti e si vedranno cadere i primi petali .

Difesa Fitosanitaria

Crittogame

Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*): in questo momento la vegetazione è in fase molto recettiva, le condizioni climatiche, però, limitano lo sviluppo d'infezioni. E' da considerare che le previsioni del tempo prevedono precipitazione per Sabato 6, eventualmente, è consigliabile attuare entro le 72 ore successive un intervento ripristino copertura con Ciprodinil o Pirimetanil. Da questa fase è possibile miscelare ai prodotti di copertura il Fosfonato di potassio.



**CONSORZIO ORTOFRUTTA
VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468

Notiziario del melo e pero 2021

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

Oidio (*Oidium farinosum* - *Podospaera leucotricha*): anche se limitatamente per le attuali condizioni atmosferiche, in frutteti dove probabilmente si sono avute maggiori ore bagnatura fogliare, sono state osservate le prime rosette con sintomi. Se accertata la presenza intervenire con Bupirimate, si ricorda sino a bottoni rosa per le varietà sensibili alla ruggine, o Cyflufenamid. Da considerare che, se Sabato 6, arriveranno delle precipitazioni, la pioggia tenderà ad ostacolare l'infezione.

Fitofagi

Afidi: se non già effettuato, dopo aver verificato la presenza di colonie d'afidi e valutato se non si ha superato la fase di "Bottoni Rosa", è ancora possibile eseguire un trattamento con Flonicamid o Tauflualinate, efficace anche contro le psille degli scopazzi, Afide grigio, Afide lanigero, Afide dalle galle rosse.

Cydia molesta: presenza di voli, non attuare interventi fitosanitari.

Eulia (*Argyrotaenia pulchellana*): presenza di voli, non attuare interventi fitosanitari.

Litocollete (*Phyllonoricter* spp.): presenza di voli, non attuare interventi fitosanitari.

Pero

Fasi fenologiche: Abate inizio fioritura, Conference "Mazzetti divaricati" con presenza di qualche fiore, Kaiser da "Mazzetti divaricati" a inizio fioritura, William inizio fioritura.



Data, 02 aprile 2021

Volume 1, Numero 4

**CONSORZIO ORTOFRUTTA
VENETA**

Notiziario del melo e pero 2021


U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*): vegetazione molto recettiva, in caso di piogge per Sabato 6 ripristinare la copertura con Mancozeb, o Ziram, o Metiram, o Fosetil-Al.

Eulia, Cydia e Trentedini: operare come per il melo.

Colpo di fuoco batterico: vegetazione recettiva, da controllare eventuali pareti colpite negli scorsi anni, asportare le parti colpite, comunicare al Servizio Fitosanitario la presenza di sintomi sospetti, trattamenti preventivi in fioritura con: *Bacillus subtilis*; *Bacillus amyloliquefaciens*; *Aureobasidium pullulans*; Acibenzolar – S – metile; Prodotti rameici; Fosetil Al.

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*): si stanno posizionando le trappole di monitoraggio.



**CONSORZIO ORTOFRUTTA
VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468