

Notiziario del melo e pero 2021

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

Melo

Fasi fenologiche: le basse temperature di questa settimana hanno moderato lo sviluppo vegetativi, Gruppo Gala fine presenza di piccoli frutti da 4 a 9 mm, Fuji allegazione, Gruppo Golden allegazione, Granny allegazione, Gruppo Imperatore allegazione; Pink Lady allegazione presenza di piccoli frutti, in gran parte allessati.

Difesa Fitosanitaria

Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*): le precipitazioni dall' 11 al 13 aprile hanno portato a gravi infezioni primarie, anche se sono state rallentate dalle basse temperature. L'attuale elevata recettività della vegetazione e la prevista instabilità climatica, che prevede piogge per la prossima settimana, consigliano di mantenere una preventiva copertura delle piante con prodotti a base di Fluxapyroxad o Penthiopyrad, che hanno pure azione di contrasto all'Oidio e *Alternaria*, oppure utilizzare altri prodotti equiparabili, usando sostanze attive di copertura come Ditianon.

Oidio (*Oidium farinosum* - *Podospaera leucotricha*): anche se limitatamente si è riscontrata la presenza d'infezioni.



Notiziario del melo e pero 2021

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

Alternaria (*Alternaria* sp): nei meleti con danni accertati lo scorso anno intervenire con Pyraclostrobin, o Boscalid, o Fluazinam, o Fludioxonil.

Afide lanigero (*Eriosoma lanigerum*): se non già attuato attuare un intervento fitosanitario con prodotti a base di Spirotetramat, o Pirimicarb, o Sulfoxaflor solamente su varietà o impianti dove lo scorso anno si sono avute infestazioni con difficoltà di controllo.

Psille: limitata o assenza di presenze, porre attenzione in quanto sono vettrici di Scopazzi.

Cydia molesta: limitati voli, non attuare interventi fitosanitari.

Eulia (*Argyrotaenia pulchellana*): limitati voli, non attuare interventi fitosanitari.

Litocollete (*Phyllonoricter* spp.): limitati voli, non attuare interventi fitosanitari.

Cimice asiatica : il freddo notturno e le limitate temperature giornaliere limitano ancora la fuoriuscita d'adulti.





Notiziario del melo e pero 2021

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

Diradamento

Considerando che si è ancora in attesa di valutare le conseguenze del gelo, non solo per l'aspetto generale ma pure all'interno delle stesse aziende e per le diverse varietà, è difficile dare delle indicazioni.

Si consiglia, prima di eseguire operazioni diradanti, di quantificare i danni, se necessario, intervenire già dalla prossima settimana.



Notiziario del melo e pero 2021

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

Pero

Fasi fenologiche: su tutte le varietà si è tra allegagione e inizio primo accrescimento dei frutti.

Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*): la vegetazione è molto recettiva, attuare una difesa preventiva con Mancozeb, o Ziram, o Metiram, o Fosetil-Al.

Eulia: nessuna presenza.

Cydia: nessuna presenza.

Trentedini: intervenire solo se ne è accertata la presenza o se storicamente il frutteto ha avuto danni.

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*): vedi melo.

