

Condifesa Verona  
**CODIVE**



CONSORZIO AGRARIO  
DEL NORD EST

PROGETTO:



**COLDIRETTI  
VERONA**



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA VERONA



# BOLLETTINO CIMICE ASIATICA 2022

ANNO 2022 NUMERO 02

15 APRILE 2022




SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA




# AREA NORD - PESCO/KIWI

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	15/04/22	Kiwi	inizio germogliamento	0	0
Valeggio	Campazzo	15/04/22	Pesco	inizio allegagione	0	0
Valeggio	SP24	15/04/22	Pesco	inizio allegagione	0	0
Valeggio	Borghetto	15/04/22	Kiwi	germogli 15 cm	0	0
Villafranca	Quaderni	15/04/22	Pesco	inizio allegagione	0	0
Villafranca	Villafranca	15/04/22	Kiwi	inizio schiusura gemme	0	0
Sommacampagna	Gasparina	15/04/22	Kiwi	inizio allegagione	0	0
Sommacampagna	Sommacampagna	15/04/22	Pesco	inizio allegagione	0	0
Sona	Sona	15/04/22	Pesco	inizio allegagione	0	0
Villafranca	Belladonna	15/04/22	Pesco	inizio allegagione	0	0
Sommacampagna	Cesarina	15/04/22	Pesco	allegagione	1	0
Bussolengo	Madonnina	15/04/22	Pesco	allegagione	0	0
Pescantina	Pescantina	15/04/22	Pesco	inizio allegagione	0	0
Villafranca	Aeroporto	15/04/22	Pesco	allegagione	0	0
Villafranca	Ceolara	15/04/22	Pesco	allegagione	0	0
Sona	Festara	15/04/22	Pesco	allegagione	0	0
Pescantina	Settimo	15/04/22	Pesco	allegagione	0	0
Villafranca	Alpo	15/04/22	Pesco	allegagione	0	0
Verona	Basson	15/04/22	Kiwi	inizio schiusura gemme	0	0
Pastrengo	Pastrengo	15/04/22	Olivo	non ancora fiorito	0	0



# AREA NORD - PESCO/KIWI

Livello catture 2° rilievo 07/04/22 ■ GIOVA  
NI



## Commenti al bollettino n. 2 del 14 aprile 2022

Le catture di adulti in campo sono ancora praticamente nulle tranne un solo sito dove è stato catturato il primo esemplare svernante della stagione. Come già detto, per ora la cimice rimane nei pressi delle case e manufatti o sulla vegetazione spontanea disponibile attorno ad essi, tenendo presente anche che la attrattività della coltura è minore se non sono presenti ancora i frutti allegati in ingrossamento. Attualmente siamo infatti tra inizio allegagione e piena allegagione, in funzione delle varietà, mentre il kiwi è ad inizio germogliamento. Si ribadisce l'utilità di iniziare a monitorare fin da subito il proprio frutteto con le modalità più volte ricordate: battitura della vegetazione, preferibilmente al mattino, con un ombrello rovesciato e un bastone; normalmente la cimice si lascia cadere nell'ombrello. Due sono le possibili attività di lotta che si possono mettere in atto fin da subito: l'utilizzo di reti (antigrandine, anti-insetto...) e l'utilizzo di trappole a cattura massale (i cosiddetti "totem") innescate con feromone di aggregazione potenziato (<https://www.venetoagricoltura.org/2021/04/progetti/progetto-regionale-cimice-asiatica-dgr-611-del-19-05-2020/>). E' opportuno che le reti vengano installate già da dopo allegagione, mentre per quanto riguarda le trappole a cattura massale, è opportuno che siano collocate non lontano dai fabbricati rurali, da dove provengono le cimici svernanti, ma sufficientemente lontano dal frutteto, in modo da non farlo cadere dentro l'area di attrazione del feromone.




# AREA SUD - MELO / PERO

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	12/04/22	Melo	metà fioritura	2	0
LEGNAGO	Bardolino	12/04/22	Melo	inizio fioritura	1	0
LEGNAGO	Cavallino	12/04/22	Pero	piena fioritura	0	0
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	12/04/22	Pero	piena fioritura	0	0
TERRAZZO	Bosco	12/04/22	Pero	piena fioritura	0	0
TERRAZZO	Graizzara	12/04/22	Pero	inizio fioritura	0	0
BEVILACQUA	Marega	00/01/00	Melo	#N/D	#N/D	#N/D
BEVILACQUA	Bevilacqua	00/01/00	Melo	#N/D	#N/D	#N/D
VILLA BARTOLO-MEA	Villabartolomea	12/04/22	Pero	piena fioritura	1	0
VILLA BARTOLO-MEA	Villabartolomea	12/04/22	Melo	metà fioritura	0	0
CASTAGNARO	Valli	12/04/22	Pero	piena fioritura	1	0
ANGIARI	Angiari	12/04/22	Melo	inizio fioritura	0	0
MINERBE	Minerbe	12/04/22	Melo	metà fioritura	0	0
BADIA POLESINE	Badia Polesine	12/04/22	Pero	piena fioritura	0	0
		00/01/00	Pero	#N/D	#N/D	#N/D
		00/01/00	Melo	#N/D	#N/D	#N/D




# AREA SUD - MELO / PERO

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	12/04/22	Melo	boccioli rosa	0	0
BONAVIGO	Padovana	00/01/00	Melo	#N/D	#N/D	#N/D
BONAVIGO	San Pietro	00/01/00	Pero	#N/D	#N/D	#N/D
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	12/04/22	Pero	piena fioritura	0	0
OPPEANO	Oppeano	12/04/22	Pero	metà fioritura	0	0
PALU'	Casotti	12/04/22	Pero	bottoni rosa	0	0
PALU'	Acquabona	12/04/22	Melo	piena fioritura	0	0
RONCO ALL'ADIGE	Boccara	12/04/22	Melo	piena fioritura	0	0
RONCO ALL'ADIGE	Tomba	12/04/22	Pero	bottoni rosa	0	0
		00/01/00	Melo	#N/D	#N/D	#N/D
BELFIORE	Provinciale 39	12/04/22	Pero	inizio fioritura	0	0
		00/01/00	Melo	#N/D	#N/D	#N/D
ZEVIO	Ca' Bianca	12/04/22	Melo	piena fioritura	0	0
ZEVIO	Ca dell'Ora	12/04/22	Pero	inizio fioritura	0	0
ZEVIO	Bridi	12/04/22	Pero	inizio fioritura	0	0
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	12/04/22	Melo	bottoni rosa	0	0
CALDIERO	Caldiero	12/04/22	Pero	bottoni rosa	0	0
VERONA SUD	Sasse	12/04/22	Melo	bottoni rosa	0	0
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	12/04/22	Melo	germogli 5 cm	0	0



# AREA SUD - MELO/PERO

Livello catture 2° rilievo 14/04/22 ■ ADULTI ■ GIOVANI



## Commenti al bollettino n. 2 del 14 aprile 2022

Le catture di adulti in campo sono ancora praticamente nulle, tranne 3 siti dove è stato catturato un individuo e un sito da 2 individui. Questi sono quindi i primi esemplari svernanti della stagione catturati nel frutteto. Come già detto, per ora la cimice rimane nei pressi delle case e manufatti o sulla vegetazione spontanea disponibile attorno ad essi, tenendo presente anche che la attrattività della coltura è minore se non sono presenti ancora i frutti allegati in ingrossamento. Attualmente siamo infatti in fioritura-allegagione per il pero, in funzione delle varietà, mentre il melo è tra bottoni rosa e fioritura. Si ribadisce l'utilità di iniziare a monitorare fin da subito il proprio frutteto con le modalità più volte ricordate: battitura della vegetazione, preferibilmente al mattino, con un ombrello rovesciato e un bastone; normalmente la cimice si lascia cadere nell'ombrello. Due sono le possibili attività di lotta che si possono mettere in atto fin da subito: l'utilizzo di reti (antigrandine, anti-insetto...) e l'utilizzo di trappole a cattura massale (i cosiddetti "totem") innescate con feromone di aggregazione potenziato (<https://www.venetoagricoltura.org/2021/04/progetti/progetto-regionale-cimice-asiatica-dgr-611-del-19-05-2020/>). E' opportuno che le reti vengano installate già da dopo allegagione, mentre per quanto riguarda le trappole a cattura massale, è opportuno che siano collocate non lontano dai fabbricati rurali, da dove provengono le cimici svernanti, ma sufficientemente lontano dal frutteto, in modo da non farlo cadere dentro l'area di attrazione del feromone.



PROGETTO:



**COLDIRETTI  
VERONA**



**Siamo presenti sui principali social!**

<https://coldirettiverona.it/>  
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/coldirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube



**IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI**



ALBAREDO D'ADIGE



ANGIARI



BADIA POLESINE



BELFIORE



BEVILACQUA



BONAVIGO



BOSCHI  
SANT'ANNA



CALDIERO



CASTAGNARO



ISOLA RIZZA



LEGNAGO



LENDINARA



MINERBE



OPPEANO



PALU'



PASTRENGO



PESCANTINA



RONCO ALL'ADIGE



ROVERCHIARA



SAN BONIFACIO



SOMMACAMPAGNA



SONA



TERRAZZO



TRECENTA



VALEGGIO SUL  
MINCIO



VERONA



VILLA BARTOLOMEA



VILLAFRANCA



ZEVIO

**SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA**