

Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna



Anno 2022, Numero 37

Data, 16/09/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Fenologia: primo livello d'invasatura.

Abbiamo iniziato a valutare gli indici di maturazione con il metodo Jaèn (Spagna).

Area	I. Jaèn
Cesena	1,74
Forlì	1,78
Longiano	1,62
Bertinoro	1,69
Montiano	1,53
Ronco Freddo	1,63
Savignano sul Rubicone	1,71
Media	1,67

L'indice idoneo per la raccolta è compreso tra il 3,5 e il 5

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl


Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna



Anno 2022, Numero 37

Data, 16/09/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Il **penetrometro** fornisce un valido indice per la determinazione della durezza della polpa (lavorando in pressione) mentre il **dinamometro** della forza per lo stacco dell'oliva dal ramo (lavorando in trazione)

VARIETA'	PENETRO- METRO		DINAMOME- TRO		
	MISURAZIONE PE- NETRAZIONE POL- PA	VALORE OTTI- MALE	MISURAZIONE FORZA DI STACCO	VALORE OTTI- MALE	
U.M.	GR/MM ²		GR/MM ²		
LECCINO	700	>300 <400	1100	>550 <650	
CORREG- GIOLO	650	>250 <350	880	>400 <500	
FRANTOIO	800	>250 <350	980	>400 <500	
PENDOLINO	550	>200 <250	1300	>600 <700	
MORAIOLO	680	>350 <400	1400	>700 <800	

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl


Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2022, Numero 37

Data, 16/09/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Situazione fitosanitaria e azioni di contrasto

Ancora limitate le catture d'adulti di Mosca e le infestazioni, con presenza di uova e larve di prima e seconda età.

Preoccupa la presenza della Margaronia, che sta sempre più allargando l'area d'infestazione, con danni agli apici vegetativi di germogli e di nuove foglie e si sta notando anche qualche caso di attacco su olive.



Il passaggio climatico verso una situazione pre autunnale con temperature diurne ancora calde e l'aumento dell'umidità favoriscono le aggressioni da parte di questi due insetti, così, per contenerne la popolazione e i danni, sia della Mosca e sia della Margaronia, comunque anche per una pulizia contro altri parassiti, si consiglia, per chi non ha ancora eseguito l'intervento fitosanitario proposto la settimana scorsa, di attuarlo a breve, utilizzando sostanze attive come Acetamiprid, o di Flupyradifurone (Sivanto), o Centaniprole (Exirel Bait), questi due ultimi non sono inseriti nel disciplinare di lotta integrata della regione Emilia-Romagna 2022.

Chi adotta una difesa da Agricoltura biologica è necessario che controlli le trappole da cattura massale, feromone sessuale e attrattivo alimentare, per verificare la loro efficacia di richiamo.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>




Gruppo Whatsapp



Youtube

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2022, Numero 37

Data, 16/09/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Chi utilizza l'adulcicida Spinosad esche, si ricordi che i trattamenti devono essere eseguiti a intervalli di 7-10 giorni. Anche se le precipitazioni pervenute non sono state copiose, le aziende che utilizzano imbrattanti per il controllo della Mosca, basalto, caolino, zeolite, gesso agricolo, devono verificare la copertura, eventualmente, in caso di dilavamento, va ripetuto il trattamento.

Parassiti fungini

Occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*),

Piombatura dell'olivo (*Mycocentrospora cladosporoides*),

Lebbra dell'olivo (*Colletotrichum*

gleosporioides);

l'abbassamento delle temperature notturne,

la prolungata bagnatura fogliare, l'elevata

umidità favoriscono lo sviluppo di parassiti

fungini, particolarmente negli oliveti dove, storicamente, hanno

fatto sentire la loro presenza. In questa fase fenologica è

possibile compiere un trattamento con prodotti rameici, che

presentano pure attività di disturbo alle ovideposizioni della

Mosca dell'olivo e contrasta la diffusione della Rogna dell'olivo

(*Pseudomonas savastanoi*).

Si consiglia, per questo particolare momento, di unire agli

eventuali interventi fitosanitari del Dentamet, concime

composto di rame zinco complessata con acido citrico,

miscelabile purché non siano formulati a reazione alcalina.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.