



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, kiwi, melo, pero e olivo 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**



**PESCO**

Fase fenologica: bottoni rosa/inizio fioritura con una percentuale che va dal 20% al 60% di fiori aperti, piena fioritura a fine settimana.

Bolla, monilia, corineo: eseguire un intervento specifico dopo caduta petali.

Afide verde: presenza sui germogli delle prime fondatrici, con varietà è ancora allo stadio di "bottoni rosa" è possibile effettuare il trattamento aficida specifico.



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, kiwi, melo, pero e olivo 2023**

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

**ALBICOCCO**



**Fase fenologica:** piena fioritura.

Monilia: al momento nessuna infezione, preparare però un trattamento a caduta petali, in ogni caso prima di eventuali piogge.



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, kiwi, melo, pero e olivo 2023**

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



**ACTINIDIA / KIWI**

**Fase fenologica: varietà verdi** di rottura gemme,  
varietà gialle a gemma cotonosa.

Situazione fisiologica delle piante: la fase del pianto è ancora leggera, considerato la scarsa idratazione delle piante.

PSA: al momento nessuna presenza di essudati.



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, kiwi, melo, pero e olivo 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**



**MELO**

Fase fenologica: varia in in funzione della varietà e dei microclima dove si trova il frutteto, pertanto siamo a rottura gemme per la varietà Dallago e a mazzetti affioranti per la Pink Lady.

Ticchiolatura: le piogge di martedì e mercoledì hanno risvegliato i parassiti fungini e potrebbero aver originato una prima infezione nelle zone dove le precipitazioni hanno avuto maggiore durata. La vegetazione è, comunque, sensibile alle infezioni, va, pertanto, programmato un trattamento fungicida prima della prossima pioggia.

Oidio: sono iniziate le infezioni primarie, vanno iniziate le attività a contrasto per gli inoculi svernanti, soprattutto nelle varietà sensibili e già ad orecchiette di topo.

Afide grigio: attendere la fase di bottoni rosa/pre-fioritura



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, kiwi, melo, pero e olivo 2023**

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



**PERO**

Fase fenologica: mazzetti affioranti per Abate Fetel e rotture gemme rotte per Kaiser.

Ticchiolatura: come per il melo.

Psilla: è iniziata l'ovideposizione, è possibile contrastarla con imbrattanti, come il caolino, che hanno funzione di repellenza all'ovideposizione.





## Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, kiwi, melo, pero e olivo 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



### OLIVO

**Fase fenologica:** è in atto la ripresa vegetative con l'allungamento dei germogli.

La piante generalmente si presentano in un buone condizioni vegetative, con chiome e terreni mediamente idratati.

#### Prima dose di fertilizzanti azotati

Proseguono le attività di potatura e, si ricorda, che appena conclusa è il momento di attuare la concimazione azotata, che va frazionata in 2-3 interventi, il primo è proprio in questa fase di ripresa vegetativa, in modo da sostenere adeguatamente la pianta nello sviluppo dei rami e nuove foglie.

Indicativamente le dosi potrebbero essere di circa 80 - 90 kg di urea ad ettaro, apportando così pressappoco 40 kg di azoto ad ettaro.

La dose per pianta si potrebbe contenere in un 2 - 2,5 etti di urea per pianta.

#### Difesa fitosanitaria

**Mosca dell'olivo:** è iniziato il controllo su trappole da monitoraggio per valutare l'andamento della dinamica di popolazione del dittero, abbiamo rilevato 4 catture di adulti.

Si precisa che il monitoraggio ha valore solo di conoscenze e studio, per attuare delle possibili previsioni di come si comporterà l'insetto e programmare, anche se c'è ancora molto tempo, i tempi per le eventuali esposizioni di trappole a cattura massale.

Il monitoraggio al momento non è esteso su tutto il territorio olivicolo.

**Oziorrinco dell'olivo:** in qualche oliveto, durante le potature, si è rilevata la presenza di rosure a forma di mezza luna, riconducibili alla presenza di Oziorrinco dell'olivo. Questo insetto non si vede di giorno perché ha abitudini notturne, i danni sono limitati, eventualmente, per gli oliveti colpiti, considerando che gli attacchi sono prevalentemente ai bordi degli appezzamenti, si consiglia di utilizzare i manicotti di "lana di vetro" da collocare sul tronco a 30/40 cm da terra per impedire all'insetto di salire durante la notte.

**Scolitidi:** sempre durante le potature si è trovata presenza di scolitidi, dei piccoli coleotteri che vivono sull'olivo e scavano delle gallerie tra legno e scorza, si individuano perché queste formano dei caratteristici disegni a raggiera. In questi casi è opportuno che, con le operazioni di potatura, si lascino sotto le piante un fastello di rami perché, tra circa 15/20 giorni, il coleottero dovrà ovideporre e sarà, pertanto attratto da queste ramaglie, che dovranno poi essere tolte dopo la prima metà di maggio e, possibilmente, bruciate per impedire lo sfarfallamento degli adulti.



## **Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, kiwi, melo, pero e olivo 2023**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**



### **OLIVO**

#### **Parassiti fungini**

Si raccomanda dopo le operazioni di potatura di eseguire un trattamento a base di Rame (rame tribasico) più zolfo (zolfo bagnabile) sono due minerali lungamente utilizzati in agricoltura come fungicidi, anche per agricoltura biologica.

Come già indicato dai controlli eseguiti con il metodo LoprienoTenerini si è constatato un la presenza di Occhio di pavone, le piogge di questi ultimi giorni hanno risvegliato anche tutti gli altri parassiti fungini dalla Lebbra, alla Piombatura, oltre che le Botryosphaerie, crittogame ancora poco conosciute, ma che hanno tutte le potenzialità per provocare disseccamenti dei rametti e cancri rameali.

Il trattamento eseguito dopo la potatura ha effetto di contenimento anche contro questi parassiti, oltre che contrastare lo sviluppo della Rogna dell'olivo.