

Fase fenologica: la fioritura si presenta molto differenziata con circa il 30 - 40% dei fiori aperti, inizio fioritura anche sulle varietà tardive Regina e Ferrovia.

Fertilizzazione

Per sostenere la produzione sono sempre utili interventi di nutrizione, in questo momento la pianta ha necessità di sostanze azotate e calcio.

Indirizzi di difesa

Monilia: vegetazione recettiva con andamento climatico favorevole al patogeno. Le temperature previste sono ottimali allo sviluppo del patogeno e, considerato che variano dai 12 ai 18°C sono necessarie circa 15 - 18 ore. Si consiglia d'intervenire preventivamente con *Bacillus subtilis*; *Bacillus amyloliquefaciens*; Polisolfuro di calcio; Bicarbonato di potassio, Tebuconazolo, massimo 2 interventi all'anno; Boscalid, massimo 3 interventi all'anno.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:
Ivoli—Ivagro
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.

Data, 29 MARZO 2023

Anno 2024, Numero 1



Attenzione alle api

Prima di eseguire qualsiasi trattamento è necessario falciare il cotico se vi è presenza di erbe spontanee in fioritura.

Si ricorda che nel periodo di fioritura, che va dall'apertura alla caduta dei petali, i trattamenti con sostanze attive tossiche per gli insetti pronubi sono vietate.

Le uniche sostanze eventualmente impiegabili sono quelle ad azione fungicida o batteriostatica che non riportano in etichetta la frase di rischio R57 (Tossico per le api) o altra indicazione di pericolosità per api e pronubi in genere.

Il codice R57 è un codice di pericolo utilizzato per classificare sostanze e miscele secondo il sistema armonizzato di classificazione e etichettatura dei prodotti chimici.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:
Ivoli—Ivagro
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA**

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.