

Fase fenologica: stadi di sviluppo compreso tra fine allegagione ed accrescimento del frutto per oltre il 70% delle varietà.

Corineo/Monilia: condizioni favorevoli alle malattie, se necessario eseguire un intervento con prodotti rameici, caoptano diathinon e sostanze attive specifiche per la monilia.

Afidi: continuare le osservazioni nel frutteto per individuare la presenza di afidi (*Myzus cerasi*). All'insorgenza dei primi focolai, intervenire con un aficida specifico. Se è presente anche la cimice asiatica, si consiglia l'utilizzo di acetamiprid.

Cimice asiatica: gli abbassamenti di temperatura hanno rallentato lo spostamento sulle piante. Va posta sempre la massima attenzione, considerando che questo insetto è molto attratto come fonte alimentare.

Falena brumale: rilevata alcune erosioni su foglie, eventuali interventi contro l'afide nero ne contengono la popolazione.

Capua: limitata presenza del ricamatore, eventuali interventi contro l'afide nero ne contengono la popolazione.

Cacecia dei fruttiferi: saltuarie erosioni su germogli.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:
Ivoli—Ivagro
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.