

Fase fenologica:

Bassa collina: ingrossamento del frutto.

Media collina: ingrossamento frutto

Alta collina: da accrescimento del frutto (cv precoci) a fine caduta petali (cv tardive)

Cracking

Le precipitazioni avvenute in questi ultimi giorni hanno portato una parte delle ciliegie in ingrossamento a subire l'effetto cracking, ossia lo spacco dei frutti. Per limitare i danni è bene intervenire con l'applicazione fogliare di calcio, che va rinnovato ad ogni pioggia, visto che bastano pochi millimetri perché il prodotto sia dilavato.

Monilia: le precipitazioni, anche se di poca durata, e le lunghe ore di bagnatura fogliare favoriscono questo parassita, pertanto, sulle varietà precoci, negli impianti ad alta densità o con vegetazione lussureggiante, è possibile intervenire con un fungicida specifico a base di *Bacillus subtilis*; *Bacillus amyloliquefaciens*; o Polisolfuro di calcio; o Bicarbonato di potassio, o Tebuconazolo.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

Ivoli—Ivagro
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la coltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivocolto ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.

Rodilegno: nella bassa e media collina sono iniziate le catture, se si attua la cattura massale vanno posizionate le trappole ad attrattivo feromonico.

Cimice asiatica: non ancora elevata presenza di adulti che hanno svernato nelle vicinanze, in caso di necessità intervenire con Deltametrina o Acetamiprid o Sali potassici acidi grassi.

Afide nero: limitate infestazioni, 1-2%. nei ceraseti dove si riscontra la presenza, considerato che sono già presenti dei focolai, intervenire con Sali potassici acidi grassi (esempio: FLIPPER®) o Pirimicarb (Esempi: Pirimor 50 o Xintech 50 o Pediment).

Moscerino dei piccoli frutti (Drosophila): si sono riscontrati voli contenuti pur tuttavia il clima è ideale per lo sviluppo del dittero e le femmine cercano frutti per ovideporre, in questo momento le varietà precocissime di ciliegie diventano un bersaglio ideale ne sono un ideale. In caso di utilizzare dei piretroidi, come la deltametrina, utile anche contro la cimice asiatica.

Mosca delle ciliegie: limitate presenze, non attuare alcun intervento fitosanitario.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:
Ivoli—Ivagro
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la coltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.