

Data, 31 MAGGIO 2024

Anno 2024, Numero 10



Fase fenologica:

Bassa collina: raccolta delle varietà precoci, maturazione per le altre con quasi termine della colorazione.

Media collina: maturazione di tutte le varietà, in conclusione la colorazione.

Alta collina: le cv precoci sono in fase di invaiatura mentre le cv precoci sono in fase di ingrossamento frutti

Monilia: in questa fase di condizioni ideali per il patogeno è importante proteggere la coltura, anche se abbandonata la raccolta, per evitare che le infezioni passino dal frutto al ramo causando gravi disseccamenti. Trattare con un fungicida specifico. .

Corineo: rilevata presenza solo in alta collina, in caso di necessità intervenire con Prodotti rameici, o Ziram, o Captano, è possibile integrare la lotta chimica con potature verdi ed eliminazione delle parti infette.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:
Ivoli—Ivagno
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.

Ricamatori: limitata presenza di Cacecia sia della bassa che alta collina.

Rodilegno: presenze in bassa, media ed alta collina. Vanno posizionate le trappole ad attrattivo feromonico per la cattura massale e attendere indicazioni per eventuali trattamenti fitosanitari al raggiungimento del picco di catture.

Cimice asiatica: presenze di adulti anche in alta collina, dove sono rilevate le prime punture di suzione su frutti in fase di invaiatura. Si consiglia di pianificare adeguate strategie di difesa contro la cimice asiatica dalla fase fenologica dell'invaiatura.

Cocciniglie: sono presenti infestazioni di *Cocciniglia di San José* in alta collina dove si sono avute presenza l'anno precedente, eventualmente intervenire con Olio minerale, o Spirotetramat o Pyriproxyfen, attenzione ai tempi di carenza. In caso di forti infestazioni è consigliato inoltre eliminare i rami più colpiti.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

Ivoli—Ivagro
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la coltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.

Data, 31 MAGGIO 2024

Anno 2024, Numero 10



Afidi: presenza di afide nero in media e alta collina, è consigliabile l'intervento con insetticidi in aree ad elevato rischio o al superamento del 3% degli organi colpiti con Sali potassici acidi grassi o Pirimicarb, o altri prodotti specifici. Attenzione ai tempi di carenza.

Drosophila suzukii: presenza a tutte le altitudini, i frutti sono in piena fase di suscettibilità agli attacchi, si consiglia di mantenere la copertura insetticida fino alla fase di raccolta, rispettando i tempi di carenza utilizzando Piretrine pure, o Acetamiprid, o Deltametrina, o Spinetoram, o Emamectina benzoate.

Mosca della frutta: nessuna presenza.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

Ivoli—Ivagro
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.