

Notiziario olivicolo 2024

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna



Anno 2024, Numero 22

Data, 07/06/2024

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Edizione del 07 06 2024

Fase fenologica: in gran parte delle zone olivicole si sta terminando la fioritura e si è entrati nella fase di allegagione, che segna l'avvio del processo di primo accrescimento delle olive. Nella variabilità varietale e microclimatica non mancano situazioni di netto ritardo o anticipo rispetto a quanto sopra riportato con presenza ancora di fioritura in atto o di piccole drupe ben sviluppate.

Fertilizzazioni

La cura e la nutrizione delle piante di olivo in questa fase sono essenziali per garantire una buona crescita dei frutti. Per coloro che hanno frazionato le somministrazioni di azoto, è il momento di eseguire l'ultima applicazione, che dovrebbe essere di circa 30 kg/ha. Questa applicazione può essere effettuata tramite dispersione fogliare, utilizzando ad esempio l'urea, assicurandosi di non superare concentrazioni dell'1-1,5% per evitare problemi di tossicità.

È consigliabile compiere queste concimazioni fogliari nelle ore più fresche della giornata e quando il vento è minimo. Quest'accorgimento aiuta a evitare la vaporizzazione dell'acqua dalla soluzione nutritiva in condizioni di temperature elevate e a minimizzare la dispersione della soluzione nutritiva a causa del vento.

È inoltre possibile accompagnare queste fertilizzazioni con prodotti a base di lignosolfonati e distillati di legno. Questi prodotti aiutano a rendere i fertilizzanti più facilmente assorbibili dalla pianta, migliorando l'efficacia della fertilizzazione e ottimizzando l'utilizzo dei nutrienti da parte della pianta.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl


Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



Notiziario olivicolo 2024

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna



Anno 2024, Numero 23

Data, 07/06/2024

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Difesa fitosanitaria

Mosca delle olive: Si consiglia di installare le trappole per la cattura massale (ad esempio FLYPACK o DAKOFAKA) entro la prossima settimana per ridurre la popolazione adulta del dittero.

Tignola dell'olivo: dai controlli settimanali risulta un ridotto numero di esemplari adulti.

Cocciniglia mezzo grano di pepe: La presenza di neanidi di prima età indica che l'infestazione è in una fase iniziale. Al momento, non si è raggiunta una soglia d'intervento di 5-10 neanidi vive per foglia. È importante monitorare attentamente la situazione per decidere il momento più opportuno per intervenire, possibilmente prima che l'infestazione raggiunga livelli critici.

Cocciniglia cotonosa: Sono state rilevate presenze saltuarie, con neanidi della prima generazione collocate sulla pagina inferiore di foglie e germogli, accompagnate da produzione di melata. Al momento, non sono necessari interventi specifici, poiché le azioni di difesa contro la Cocciniglia mezzo grano di pepe ridurranno anche la presenza di questo coccide.

Margaronia o Piralide dell'olivo: È stata rilevata sulle chiome degli olivi con erosioni dei nuovi germogli. Al momento, non è necessario intervenire, ma è importante monitorare attentamente la situazione. Eventuali trattamenti con agrofarmaci contro la Tignola potrebbero essere efficaci anche per contenere la popolazione di questo lepidottero.

Occhio di pavone, Cercosporiosi o Piombatura, Lebbra dell'olivo: durante i monitoraggi è emersa la presenza di diffuse infezioni da parassiti fungini, particolarmente dell'Occhio di pavone. Dopo la fioritura, si consiglia l'uso di prodotti a base di rameici.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.