

Fasi fenologiche:

Varietà precoci: accrescimento frutto (Begareaux – Rita – Earleybigi)

Varietà medie ingrossamento frutto

Varietà tardive: fioritura - allegagioneù

Difesa fitosanitaria

Corineo/Monilia: condizioni favorevoli alla malattie effettuare un trattamento con prodotti rameici o ziram o captano o dithianon. Va controllata attentamente l'efficacia del trattamento post-intervento.

Afidi: alla comparsa intervenire con Sali potassici acidi grassi (saponi molli), Pirimicarb o Spirotetramat restano raccomandati, se presenta anche la Cimice asiatica utilizzare acetamiprid.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

Ivoli—Ivagro
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.

Cimice asiatica: attenzione nei ceraseti, è fondamentale controllare costantemente e, in caso di presenza, pianificare tempestivamente interventi mirati, in particolare lungo i bordi del frutteto. In questa fase, il ciliegio rappresenta una delle colture più attrattive per *la cimice asiatica* in quanti i giovani frutti diventano una prima fonte di nutrimento. Prestare massima attenzione per prevenire danni significativi, in caso di necessità intervenire con acetamiprid o deltametrina, con limitate infestazioni con Sali potassici degli acidi grassi.

Suggerimenti agronomici per prevenire le spaccature dei frutti

Durante la fase di maturazione delle ciliegie, le piogge possono favorire un accumulo di umidità che aumenta il rischio di spaccature. Per prevenire questo fenomeno, si consigliano applicazioni fogliari con soluzioni a base di cloruro di calcio o ossido di calcio, eventualmente combinati con distillato di legno per potenziarne l'efficacia.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:
Ivoli—Ivagro
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.