



# Notiziario olivicolo 2025

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

Associazione Frantoiani Oleari  
dell'Emilia-Romagna



Anno 2025, Numero 20

Data, 16/05/2025

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

**Fase fenologica:** il processo di formazione dei boccioli prosegue regolarmente, con variazioni legate all'esposizione solare e alla varietà coltivata. Nelle zone più soleggiate e con varietà precoci, i boccioli iniziano ad aprirsi, mostrando i caratteristici fiori bianchi. Le forti variazioni di temperatura rendono complessa la previsione della fioritura, che potrebbe manifestarsi in maniera differenti nei diversi areali olivicoli e anche negli stessi oliveti.

## Situazione fitosanitaria

**Tignola dell'olivo:** monitoraggio con trappole a feromoni indica una cattura media di 2-4 adulti per trappola a settimana, riferibile alla prima generazione. I valori sono inferiori alla soglia di intervento, ma è opportuno continuare il monitoraggio per valutare l'andamento della popolazione in prossimità della piena fioritura.

**Margaronia:** presente sui nuovi germogli, con maggiore incidenza negli impianti giovani. Se necessario, è consigliato l'impiego di *Bacillus thuringiensis* per il controllo biologico delle larve, oppure di saponi potassici a base di acidi grassi per un'azione meccanica mirata o azadiractina (esempio: Oikos).

**Cotonello dell'olivo:** sono state rilevate delle colonie su germogli e infiorescenze, con distribuzione irregolare nei vari appezzamenti. L'infestazione è generalmente contenuta e non richiede interventi, ma si consiglia un monitoraggio attento nelle zone storicamente soggette a forti attacchi. In caso di necessità è possibile utilizzare il sapone potassico, che agisce per contatto distruggendo la cuticola e favorendo la disidratazione dell'insetto.

## Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada  
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini  
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39  
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari  
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



# Notiziario olivicolo 2025

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

Associazione Frantoiani Oleari  
dell'Emilia-Romagna



Anno 2025, Numero 20

Data, 16/05/2025

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

**Fleotribo:** per le aziende che hanno utilizzato le fascine come "rami esca" per questo coleottero è il momento di allontanarle dall'oliveto entro i prossimi giorni, prima dello sfarfallamento degli adulti.

**Tripide dell'olivo:** sono stati osservati danni su giovani foglie, con perdita di tessuto e alterazioni cromatiche, l'intensità del danno è limitata, quindi non sono necessari trattamenti insetticidi.

**Mosca dell'olivo:** l'attività di volo degli adulti è contenuta, con catture tra 0 e 4 individui per trappola a settimana. Considerando la fase fenologica e le condizioni climatiche, è consigliabile proseguire con il monitoraggio settimanale per prevenire danni futuri e chi ha intenzione di utilizzare le trappole a lunga durata (180 giorni) di posizionarle.

**Cimice asiatica:** presenze sporadiche sono state segnalate in alcune aree olivicole. Data la capacità di adattamento della specie e le temperature primaverili favorevoli alla sua diffusione, è raccomandata una sorveglianza costante, soprattutto vicino a frutteti e colture erbacee.

## Avversità fungine

**Occhio di pavone:** la presenza del patogeno è diffusa su scala regionale, favorita dall'umidità e dalle recenti piogge. Durante la fase di formazione dei boccioli, l'uso di rame può risultare fitotossico, quindi è preferibile impiegare principi attivi alternativi con azione preventiva e curativa, come alcuni fungicidi biologici e prodotti a base di fosfonati.

## Gestione del terreno inerbito

Nei sistemi di coltivazione con copertura vegetale, il controllo dell'erba deve essere effettuato con interventi regolari di sfalcio, utilizzando attrezzature specifiche che garantiscano una gestione efficiente della biomassa. Le operazioni di taglio devono essere eseguite ogni volta che l'erba raggiunge un'altezza di circa **25 cm**, evitando la fioritura per limitare la competizione idrica e nutrizionale con le piante coltivate.

### Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada  
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini  
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl


Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39  
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari  
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



**Associazione Frantoiani Oleari  
dell'Emilia-Romagna**

# Notiziario olivicolo 2025

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2025, Numero 20

Data, 16/05/2025

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

La scelta della macchina dipende dalle caratteristiche del terreno, dalla densità dell'inerbimento e dagli obiettivi agronomici dell'azienda, possono essere trinciatrici a coltelli o a martelli o falciatrici rotative o a dischi o trinciatrici interfilari o rulli frantumatori.

## Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. **Orazio Strada**  
(ditta Strada) e p.a. **Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: p.a. **Ivan Forcellini**  
(Terre Emerse) e p.a. **Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

**AIPO OP soc. coop. arl**

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39  
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari  
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici **dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna** in sigla **“A.R.F.O.”** e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'**PAPP “AIPOVERONA”** scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.