

**Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna**

Notiziario olivicolo 2025

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2025, Numero 27

Data, 04/07/2025

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Fase fenologica: primo accrescimento dell'oliva.

Gli olivi, nonostante abbiano affrontato recentemente ondate di calore intense, si presentano in buone condizioni vegetative. In alcuni appezzamenti, però, si è osservata la presenza di foglie ingiallite e cadute, riconducibili a cause diverse: in parte a patologie fungine come la *piombatura*, in parte a un normale ricambio fisiologico della pianta, ma in altri casi si tratta di sintomi da stress termico. In queste situazioni, è consigliabile intervenire con corroboranti naturali come estratti di alghe marine, glicina betaina o distillato di legno, che aiutano la pianta a ripristinare l'equilibrio fisiologico.

Situazione fitosanitaria

Tignola dell'olivo: si sta esaurendo la generazione carpofaga, che attacca le piccole olive.

Mosca delle olive: nelle trappole di monitoraggio si rileva una presenza limitata di adulti, probabilmente a causa delle temperature elevate registrate negli ultimi giorni, che ne hanno ridotto l'attività di volo. Per chi intende adottare strategie repellenti e antideponenti a base di polveri di roccia (bentoniti, caolini, talco, zeoliti), si avvicina il momento ottimale per l'applicazione. Il trattamento va distribuito in modo uniforme su tutta la vegetazione, preferibilmente con l'aggiunta di un bagnante e di un adesivante, per migliorarne la copertura e l'adesione su foglie e drupe, aumentando la resistenza al dilavamento.

Per chi adotta la cattura massale, è il momento di installare le trappole: si consiglia una trappola ogni due piante, oppure una per pianta in caso di olivi con chiome molto sviluppate. Tra i dispositivi disponibili si segnalano BioMagnet™, Eco-Trap®, Dakofaka® e Flypack Dacus Trap, tutti efficaci nel contenimento della popolazione adulta di *Bactrocera oleae*.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aiроверona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl


Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



**Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna**

Notiziario olivicolo 2025

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2025, Numero 27

Data, 04/07/2025

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Cocciniglia mezzo grano di pepe: dove sono stati eseguiti interventi fitosanitari, la presenza di neanidi è diminuita. Dove non sono state adottate misure, è ancora possibile intervenire con olio minerale o saponi molli potassici, che contribuiscono anche a rimuovere i residui organici lasciati dalle cocciniglie, come la melata, limitando così lo sviluppo delle fumaggini.

Oziorrinco: ancora presenze del coleottero in più oliveti, la difesa va attuata collocando sul tronco fasce di lana resinata, così da impedire la risalita dell'insetto sulla chioma.

Occhio di pavone, Lebbra delle olive, Piombatura: in presenza di infezioni accertate, è consigliabile intervenire con prodotti rameici (come ossicloruro o idrossido di rame) che svolgono un'azione preventiva e curativa contro i principali patogeni fungini. In alternativa o in integrazione, si può ricorrere a fungicidi sistemici come il pyraclostrobin, efficace anche in condizioni di elevata pressione infettiva.

Grandine

Le condizioni climatiche di stagione potrebbero causare grandinate, nelle zone eventualmente colpite è necessario intervenire per tempo con prodotti rameici, per disinfettare le ferite da percosse e ridurre l'insorgenza o la diffusione di Rogna dell'Olivio. Si consiglia l'aggiunta del concime a base di rame citrato e zinco tipo Dentamet.

Si ricorda che i tecnici dell'Associazione Pierluca Turchi e Orazio Strada sono a disposizione per eventuali indicazioni.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.